



INDICACIONES

PARA RECOLECCIÓN DE MUESTRAS

LABINCO IP-05-27

PRUEBAS DE ALERGIA EN SANGRE (IgE específica / Panel de alergias)

Antes del examen

- NO necesita ayuno (a menos que su médico haya solicitado otros exámenes).
- NO debe suspender sus antialérgicos (loratadina, cetirizina, fexofenadina, desloratadina, etc.).
- NO es necesario dejar de consumir el alimento sospechoso antes de la prueba.
- Puede tomar sus medicamentos habituales, salvo indicación médica contraria.

Situaciones especiales

- Si tuvo una reacción alérgica grave reciente (anafilaxia), informe al médico antes de realizar el examen.
- Si está tomando corticoides por tiempo prolongado, notifíquelo a nuestro personal.

Importante

- Esta prueba mide anticuerpos en sangre.
- El resultado debe ser interpretado por su médico junto con sus síntomas.
- No se recomienda eliminar alimentos sin diagnóstico confirmado.

Aviso para pacientes en tratamiento con Xolair® (Omalizumab)

El medicamento Xolair® puede modificar los niveles de IgE específica medidos en el laboratorio. Debido a esto, los resultados de los paneles de alergia pueden verse alterados y deben interpretarse con precaución por el médico tratante.

- Recomendaciones:
- Informe siempre al laboratorio si está en tratamiento con Xolair®.
- La interpretación de los resultados debe realizarse junto con la historia clínica y otros estudios de alergia.

Actualizado en marzo 2026